Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 16:11

Link do produktu: https://sklepppajek.pl/trutka-na-myszy-i-szczury-pasta-3-kg-extrat-bromadiolon-can-agri-p-304.html



Trutka na myszy i szczury, pasta 3 kg, Extrat, bromadiolon, Can Agri

Cena **134,00 zł**

Opis produktu

- EXTRAT - bromadiolon pasta na szczury i myszy 3 kg

  Profesjonalna trutka do zwalczania myszy, szczurów i gryzoni - EXTRAT w formie pasty

- Dzięki silnym aromatom wabiącym trutka EXTRAT jest skuteczniejsza od innych rodentycydów co pozwala zaoszczędzić środki przeznaczone na deratyzację i skrócić cały proces.
- Bardziej soczysta i “smaczniejsza” dla gryzoni niż inne trutki!
- Nie wywołuje podejrzliwości u gryzoni.
- Specjalna receptura wabiąca gryzonie - szczury i myszy nie mogą się oprzeć trutce EXTRAT, nawet jeśli obok mają inną żywność!
- Zabójczo skuteczne działanie bromadiolone - uniwersalnego środka gryzoniobójczego polecanego przez profesjonalistów!
- Bardzo szybkie działanie - trutka pozwala zwalczyć gryzonie w ciągu około 2 tygodni (w zależności od nasilenia problemu).
- Traktowana przez myszy i szczury jako pokarm.
- Zabezpieczona przed pleśnieniem
- Szczury i myszy nie mogą się jej oprzeć!
- Aż 50% bardziej atrakcyjna w porównaniu ze zwykłą żywnością.
- Stabilizatory oraz tłuszcze i oleje zapobiegają jej utlenianiu dzięki czemu długo zachowuje świeżość i soczystość. Pozostaje atrakcyjna do spożycia w każdych warunkach.

- Sposób użycia: Przed użyciem trutki na myszy i szczury EXTRAT zaleca się ocenić stopień nasilenia problemu. Umieścić trutkę w miejscach gdzie widoczne są oznaki bytowania i działalności gryzoni (np. świeże odchody). Monitoruj obecność gryzoni (nadgryzione saszetki świadczą o bytowaniu gryzoni). Trutkę EXTRAT należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczeń w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach, stacjach deratyzacyjnych (również dostępnych w naszej ofercie). W trakcie stosowania środka gryzoniobójczego należy regularnie sprawdzać teren, w przypadku zidentyfikowania martwych gryzoni należy się ich pozbyć. W przypadku ubywania środka należy regularnie go uzupełniać - jeżeli zostanie całkowicie spożyty w danym punkcie należy zwiększyć jego ilość. Usuń trutkę po

zakończeniu akcji deratyzacyjnej.